

## 紅龍果秋行軍蟲緊急防治藥劑使用方法及其範圍

| 藥劑名稱                            | 每公頃每次施藥量   | 稀釋倍數  | 施藥時期及方法               | 注意事項          |
|---------------------------------|------------|-------|-----------------------|---------------|
| 2.8(%)第滅寧 EC<br>(Deltamethrin)  | 0.5-1.1 公升 | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥，每隔 7 天施藥一次。 | 採收前 12 天停止用藥。 |
| 25 g/L 第滅寧 EC<br>(Deltamethrin) | 0.5-1.1 公升 | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥，每隔 7 天施藥一次。 | 採收前 12 天停止用藥。 |
| 2.8(%)第滅寧 EW<br>(Deltamethrin)  | 0.5-1.1 公升 | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥，每隔 7 天施藥一次。 | 採收前 12 天停止用藥。 |
| 2.4(%)第滅寧 SC<br>(Deltamethrin)  | 0.5-1.1 公升 | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥，每隔 7 天施藥一次。 | 採收前 12 天停止用藥。 |
| 11.7(%)賜諾特 SC<br>(Spinetoram)   | 0.3-0.5 公升 | 3,200 | 害蟲發生時開始施藥，每隔 7 天施藥一次。 | 採收前 12 天停止用藥。 |
| 5.87(%)賜諾特 SC<br>(Spinetoram)   | 0.5-1 公升   | 1,600 | 害蟲發生時開始施藥，每隔 7 天施藥一次。 | 採收前 12 天停止用藥。 |