

百慕達草秋行軍蟲緊急防治藥劑及其使用方法與範圍

| 藥劑名稱 | 每公頃每次施藥量 | 稀釋倍數 | 施藥時期及方法 |
|--|----------------|-------|---------------------------|
| 5.87% 賜諾特 SC (spinetoram) 作用機制：IRAC-5 | 0.625 公升 | 1,600 | 害蟲發生時開始施藥，每隔 10 天施藥一次。 |
| 11.7% 賜諾特 SC (spinetoram) 作用機制：IRAC-5 | 0.33 公升 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥，每隔 10 天施藥一次。 |
| 100 G/L (10% W/V) 諾伐隆 DC (novaluron) 作用機制：IRAC-15 | 0.5-0.8 公升 | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥，每隔 7 天施藥一次。 |
| 20% 氟大滅 WG (flubendiamide) 觸殺型 作用機制：IRAC-28 | 0.3-0.35 公斤 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥，每隔 7 天施藥一次 |
| 18.4% 剋安勃 SC (chlorantraniliprole) 觸殺型 作用機制：IRAC-28 | 0.1-0.3 公升 | 2,500 | 害蟲發生時開始施藥，每隔 10-14 天施藥一次。 |
| 5% 護賽寧 SL (flucythrinate) 觸殺型 作用機制：IRAC-3A | 1 公升 | 800 | 害蟲發生時開始施藥，每隔 7-10 天施藥一次。 |
| 10% 依芬寧 EC (etofenprox) 觸殺型 作用機制：IRAC-3A | 1.6 公升 | 750 | 害蟲發生時開始施藥，每隔 10-14 天施藥一次。 |

| 藥劑名稱 | 每公頃每次施藥量 | 稀釋倍數 | 施藥時期及方法 |
|---|----------|-------|---------------------------|
| 20% 依芬寧 WP (etofenprox) 觸殺型 作用機制：IRAC-3A | 0.67 公斤 | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥，每隔 10-14 天施藥一次。 |
| 48.1% 蘇力菌 WG 作用機制：IRAC-11A | 0.8-1 公斤 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥，每隔 7 天施藥一次。 |
| 54% 鮎澤蘇力菌 NB-200 WG 作用機制：IRAC-11A | 0.8-1 公斤 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥，每隔 7 天施藥一次。 |