

高粱秋行軍蟲緊急防治藥劑與其使用方法及範圍

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數	施藥時期及方法	注意事項
5.87% 賜諾特 SC (spinetoram)	0.6-2.6 公升	600	害蟲發生時開始施藥， 每隔 10 天施藥一次。	採收前 9 天 停止施藥。
11.7% 賜諾特 SC (spinetoram)	0.3-1.3 公升	1,200	害蟲發生時開始施藥， 每隔 10 天施藥一次。	採收前 9 天 停止施藥。
100 G/L (10% W/V)諾伐隆 DC (novaluron)	0.5-0.8 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥， 每隔 7 天施藥一次。	採收前 10 天 停 止 施 藥。
18.4% 剋安勃 SC (chlorantraniliprole)	0.1-0.3 公升	2,500	害蟲發生時開始施藥， 每隔 10-14 天施藥一次。	採收前 14 天 停 止 施 藥。
5% 護賽寧 SL (flucythrinate)	1 公升	800	害蟲發生時開始施藥， 每隔 7-10 天施藥一次。	採收前 15 天 停 止 施 藥。
10% 依芬寧 EC (etofenprox)	1.6 公升	750	害蟲發生時開始施藥， 每隔 10-14 天施藥一次。	採收前 15 天 停 止 施 藥。
20% 依芬寧 WP (etofenprox)	0.67 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥， 每隔 10-14 天施藥一次。	採收前 15 天 停 止 施 藥。
75% 硫敵克 WP (thiodicarb)			每公頃使用 250 克硫敵 克混合 10-15 公斤米糠 與 1 公斤蔗糖之餌料， 於植株莖基部施用，以 防治 3 齡以上幼蟲	
48.1% 蘇力菌 WG	0.8-1 公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥， 每隔 7 天施藥一次。	
54% 鮎澤蘇力菌 NB-200 WG	0.8-1 公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥， 每隔 7 天施藥一次。	